Partie ST La structure du globe terrestre

1^{er} chapitre

I) Des contrastes importants entre continents et océans TP 1

Cf TP1 : La répartition statistique des altitudes terrestres donne une courbe bimodale.

On perçoit donc la dualité géologique OCEAN vs CONTINENTS

Retrouve-t-on une différence au niveau des roches ?

II) On retrouve cette dualité au niveau des roches TP 2

- Au niveau des OCEANS : On a exploré des failles le long de la dorsale médio-atlantique grâce à un sous-marin. Mission VEMA par exemple.

2 roches composent la CO (croûte océanique)

- Le basalte
- Le gabbro

- Au niveau des CONTINENTS

Le socle de la CC (croûte continentale) est constitué de Granite et d'autres roches magmatiques et métamorphiques.

Celles-ci sont recouvertes de roches sédimentaires (déposées lors des diverses incursions marines sur les continents).

III) Apport des études sismologiques TP 3

L'étude de la propagation des ondes P et S à l'intérieur du globe permet de mettre en évidence plusieurs discontinuités majeures (= limites entre milieux aux propriétés physico-chimiques différentes ; les ondes sont réfléchies, réfractées...).

A) Le Moho, entre Croûte et Manteau

Le Moho se caractérise par une augmentation brutale de la vitesse des ondes P et S (V_p et V_s).

	Vp (km/sec)	Roches	Densité	Epaisseur (km)
CO et CC	4 à 6	γ β G	2.7 à 3	7 à 40
Manteau	6 à 10	Péridotite	3.3	> 2800 entre croûtes et noyaux

B) Le PREM : Modèle Terre de référence TP 4

L'étude du trajet et de la vitesse des ondes en profondeur, permet de construire ce modèle de globe en plusieurs couches.

RAPPEL : le manteau est constitué de roches denses à l'état solide : **la PERIDOTITE** (roche magmatique grenue)

La discontinuité de GUTENBERG (-2900 km) sépare le manteau solide du noyau externe liquide.

C) Un modèle basé sur le comportement des roches Tâche complexe + P 176 ex 2

L'étude des séismes au niveau d'une zone de subduction (Tongas) a permis de différencier :

	Litho	Solide cassant	Croûte + M >	
	Asthéno	Solide moins cassant	M moyen	L'asthénosphère débute qd $T^\circ > 1300^\circ\text{C}$. La roche devient plus visqueuse, les ondes sont ralenties, c'est la LVZ = Low velocity zone
	Manteau proprement dit		M <	

IV) Un modèle thermique de globe

Voir Page 166

Géotherme	Gradient géothermique
Evolution de la T° en fonction de la profondeur	Taux d'augmentation du géotherme en °C/km
Diagramme PT	Calculer le gradient Dans la Lithosphère Dans l'Asthénosphère

On remarque que le gradient géothermique est propre à chaque enveloppe. Cela s'explique par des mécanismes de transferts thermiques différents...

CONDUCTION dans la Litho Transfert de chaleur entre 2 points en contact CONVECTION dans l'Asthéno Transfert de chaleur par déplacement de matière	

La convection mantellique à différents niveaux

Ces mouvements de convection dans le manteau sont très efficaces (gradient + faible) et sont responsable de la machinerie thermique du globe... (Descente de matériaux froids, montée de matériaux chauds)